


がん化学療法個人計画書

患者の状態により輸液の内容・量及び投与速度を変更する場合があります。

科名	適応がん種	レジメン名
	胆道癌	ゲムシタビン
投与予定	休薬を含めて1クール 28 日 施行可能な限り	



Day1

点滴静注 30分
 生食 100ml
 デキサメタゾン 6.6mg

点滴静注 30分
 生食 100ml
ゲムシタビン
1000mg/m²

点滴静注 5分
 生食 50ml

Day8

Day1と
同内容

Day15

Day1と
同内容

備考

薬品名	申請投与量	計算量	実際の投与量	薬価最小組み合わせ								
ゲムシタビン	1000 mg/m ²	#REF! mg/body	mg/body	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; text-align: center;">内</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">200mg</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">0mg</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">0mg</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">訳</td> <td style="text-align: center;">1000mg</td> <td style="text-align: center;">0mg</td> <td style="text-align: center;">0mg</td> </tr> </table>	内	200mg	0mg	0mg	訳	1000mg	0mg	0mg
内	200mg	0mg	0mg									
訳	1000mg	0mg	0mg									

併用内服薬	用量(1日量)	用法	投与期間