

# がん化学療法個人計画書

患者の状態により輸液の内容・量及び投与速度を変更する場合があります。

科名	適応がん種	プロトコール名
	乳癌	AC
投与予定	休薬を含めて 1クール	21 日 4クール施行



**Day1**

アプレピタント125mg 内服

点滴静注 30分  
 生食 100ml  
 パロノセトロン 0.75mg  
 デキサメタゾン 9.9mg

点滴静注 5分  
 生食 50ml  
**ドキソルビシン**  
**60mg/m<sup>2</sup>**

点滴静注 5分  
 生食 50ml

★プライミング・フラッシュ 生食必要★

点滴静注 5分  
 生食 50ml  
**シクロホスファミド**  
**600mg/m<sup>2</sup>**

備考

薬品名	申請投与量	計算量	実際の投与量	薬価最小組み合わせ	備考
ドキソルビシン	60 mg/m <sup>2</sup>	#REF! mg/body	mg/body		患者の状態に合わせて40~60mg/m <sup>2</sup> で使用【総投与量】500mg/m <sup>2</sup> を超えないこと
シクロホスファミド	600 mg/m <sup>2</sup>	#REF! mg/body	mg/body		患者の状態に合わせて500~600mg/m <sup>2</sup> で使用

併用内服薬	用量(1日量)	用法	投与期間
デキサメタゾン	8mg	分2 朝昼食後	day2~4
アプレピタント	125mg	ドキソルビシン 投与60分前までに内服	day1
アプレピタント	80mg	分1 朝食後	day2、3