



がん化学療法個人計画書

患者の状態により輸液の内容・量及び投与速度を変更する場合があります。

科名	適応がん種	プロトコール名
	乳癌	トラスツズマブ(1週毎)+Weekly/パクリタキセル
投与予定	休薬を含めて1クール 7 日 12 クール施行	



パクリタキセル投与時には、0.22ミクロン以下のメンブランフィルターを用いたインラインフィルターを通して投与すること

・デキサメタゾン患者の状態に合わせて6.6mgまで減量可
 ※2回目以降のトラスツズマブ投与時間:基本30分
 患者の年齢・状態により
 2回目 60分、3回目以降 30分
 2回目以降 60分
 で施行する場合もあり

・トラスツズマブ:投与予定日より+7日以内は"2回目以降"投与量、+8日からは"初回投与量"に増量し再開する

薬品名	申請投与量	計算量	実際の投与量	薬価最小組み合わせ	備考
トラスツズマブ	4 mg/Kg	#REF! mg/body	mg/body	内 60mg 0mg 訳 150mg 0mg	初回投与量
	2 mg/Kg	#REF! mg/body	mg/body	内 60mg 0mg 訳 150mg 0mg	2回目以降
パクリタキセル	80 mg/m ²	#REF! mg/body	mg/body	内 30mg 0mg 訳 100mg 0mg	患者の状態に合わせて70~80mg/m ² で使用

併用内服薬	用量(1日量)	用法	投与期間
ジフェンヒドラミン	50mg	パクリタキセル投与30分前までに内服	day 1

備考	
----	--