


がん化学療法個人計画書

患者の状態により輸液の内容・量及び投与速度を変更する場合があります。

科名	適応がん種	プロトコール名
	乳癌	トラスツズマブ+ゲムシタビン
投与予定	休薬を含めて1クール	21日 可能な限り施行



Day1

点滴静注 5分
生食 50ml

点滴静注
※初回:90分 2回目~:基本30分
生食 250ml
トラスツズマブ
初回:8mg/Kg
2回目以降:6mg/Kg

点滴静注 30分
生食 100ml
デキサメタゾン 6.6mg

点滴静注 30分
生食 100ml
ゲムシタビン
1250mg/m²

点滴静注 5分
生食 50ml

Day8

点滴静注 30分
生食 100ml
デキサメタゾン 6.6mg

点滴静注 30分
生食 100ml
ゲムシタビン
1250mg/m²

点滴静注 5分
生食 50ml

※2回目以降のトラスツズマブ投与時間:
基本30分
患者の年齢・状態により
2回目 60分、3回目以降 30分
2回目以降 60分
で施行する場合もあり

・トラスツズマブ: 投与予定日より+7日以内は"2回目以降"投与量、+8日からは"初回投与量"に増量し再開する

薬品名	申請投与量	計算量	実際の投与量	薬価最小組み合わせ	備考
トラスツズマブ	8 mg/Kg	#REF! mg/body	mg/body	内 60mg 0mg 訳 150mg 0mg	初回投与量
	6 mg/Kg	#REF! mg/body	mg/body	内 60mg 0mg 訳 150mg 0mg	2回目以降
ゲムシタビン	1250 mg/m ²	#REF! mg/body	mg/body	内 200mg 0mg 訳 1000mg 0mg	患者の状態に合わせて1000~1250mg/m ² で使用

備考	
----	--