



がん化学療法個人計画書

患者の状態により輸液の内容・量及び投与速度を変更する場合があります。

科名	適応がん種	プロトコール名
	乳癌(術前補助化学療法)	トラスツズマブ(3週毎)+Nab-PTX
投与予定	休薬を含めて1クール	21日 4クール



Nab-PTXは抗がん剤であると同時に血液製剤であり、処方とは別で、事前に施行日毎に血液製剤伝票が必要

Nab-PTXの投与にあたっては、インラインフィルターを使用しないこと。アルブミンのため目詰まりする。

パクリタキセルと異なり点滴セットの制限はない

※2回目以降のトラスツズマブ投与時間: 基本30分
 患者の年齢・状態により
 2回目 60分、3回目以降 30分
 2回目以降 60分 で施行する場合もあり

・トラスツズマブ: 投与予定日より+7日以内は"2回目以降"投与量、+8日からは"初回投与量"に増量し再開する

・Nab-PTX: 有害事象発現時の用量調整の目安あり

薬品名	申請投与量	計算量	実際の投与量	薬価最小組み合わせ	備考
トラスツズマブ	8 mg/Kg	#REF! mg/body	mg/body	内 60mg: 0mg 150mg: 0mg	初回投与量
	6 mg/Kg	#REF! mg/body	mg/body	内 60mg: 0mg 150mg: 0mg	2回目以降
Nab-PTX	260 mg/m ²	#REF! mg/body	mg/body		
実際に投与する液量	生食100mlで	0 ml			

備考