


がん化学療法個人計画書

患者の状態により輸液の内容・量及び投与速度を変更する場合があります。

| | | |
|------|-------------------------|-----------------|
| 科名 | 適応がん種 | プロトコール名 |
| | 進行再発結腸・直腸癌 | セツキシマブ+イリノテカン B |
| 投与予定 | 休薬を含めて 1クール 35日 施行可能な限り | |



Day1・15

点滴静注 15分
生食 50ml
デキサメタゾン 9.9mg
d-クロルフェニラミン 5mg

点滴静注 30分
グラニセトロンバッグ3mg 100ml

点滴静注 120分
生食 500-α ml
(セツキシマブ量に応じて減量)
セツキシマブ※
1クール目初回: 400mg/m²
(2回目以降はDay8の投与量・時間で投与)

点滴静注 60分
生食 100ml

点滴静注 90分
生食 500ml
イリノテカン
150mg/m²

点滴静注 5分
生食 50ml

Day8・22・29

点滴静注 15分
生食 50ml
デキサメタゾン 6.6mg
d-クロルフェニラミン 5mg

点滴静注 30分
生食 100ml

点滴静注 60分
生食 250ml
セツキシマブ※
250mg/m²

点滴静注 60分
生食 100ml

※セツキシマブ投与終了後、少なくとも1時間は観察期間(バイタルサインをモニターする等)を設ける。
又、セツキシマブと同じ投与速度でラインを生食にてフラッシュする

| 備考 |
|----|
| |

| 薬品名 | 申請投与量 | 計算量 | 実際の投与量 | 薬価最小組み合わせ | 備考 |
|--------|-----------------------|---------------|---------|---------------------------|-------|
| セツキシマブ | 400 mg/m ² | #REF! mg/body | mg/body | | 初回投与量 |
| | 250 mg/m ² | #REF! mg/body | mg/body | | 2回目以降 |
| イリノテカン | 150 mg/m ² | #REF! mg/body | mg/body | 内 40mg: 0mg 100mg: 0mg | |

| 併用内服薬 | 用量(1日量) | 用法 | 投与期間 |
|---------------------------|---------|------------|--------------|
| デキサメタゾン | 8mg | 分2 朝昼食後 | day2、3、16、17 |
| 患者の状態に合わせて下記の内服を処方することがある | | | |
| 炭酸水素ナトリウム | 1.5g | 分3 毎食間 | day1~4、15~18 |
| 酸化マグネシウム | 2.0g | 分3 毎食後 | |
| ウルソデオキシコール酸 | 300mg | | |
| メクロプラミド | 15mg | | |

○infusion reactionについて

- ・投与速度は10mg/分以下: 速いとリスク増加。
- ・重度は投与中止し再投与は行わない。
- ・軽度~中等度は投与速度を半分の5mg/分以下。

再度infusion reactionが現れた場合には再投与しない。

○G3以上の皮膚症状発現時の投与延期・減量基準
まず投与延期または中止
投与延期後、セツキシマブ再開時の用量調節の目安有り

様式Actis-21-SEP(1)-XXXX