


# がん化学療法個人計画書

患者の状態により輸液の内容・量及び投与速度を変更する場合があります。

科名	適応がん種	プロトコール名
	結腸・直腸癌	XELOX
投与予定	休薬を含めて1クール 21 日 可能な限り施行	



**Day1**

点滴静注 30分  
 グラニセトロンバッグ3mg 100ml  
 デキサメタゾン 9.9mg  
 d-クロルフェニラミン 5mg  
 ファモチジン 20mg

★プライミング・フラッシュ 5%ブドウ糖液必要★

点滴静注 120分  
 5%ブドウ糖液 250ml  
**オキサリプラチン**  
 130mg/m<sup>2</sup>

有害事象により休薬・減量又は中止する場合には、有害事象の症状・重症度等に応じた減量・休薬の基準があるので注意すること

カペシタビン(2000mg/m <sup>2</sup> /日)			
1.36m <sup>2</sup> 未満	2400mg/body/日	1日2回朝夕食後	14日間投与 7日間休薬
1.36~1.66m <sup>2</sup> 未満	3000mg/body/日		
1.66~1.96m <sup>2</sup> 未満	3600mg/body/日		
1.96m <sup>2</sup> 以上	4200mg/body/日		

薬品名	申請投与量	計算量	実際の投与量	薬価最小組み合わせ	備考
オキサリプラチン	130 mg/m <sup>2</sup>	#REF! mg/body	mg/body		
カペシタビン	プロトコール登録時のカペシタビン投与基準量は上記表参照		mg/body		記載投与量は1日の投与量

併用内服薬	用量(1日量)	用法	投与期間

備考	
----	--