



# がん化学療法個人計画書

患者の状態により輸液の内容・量及び投与速度を変更する場合があります。

科名	適応がん種	プロトコール名
	切除不能な進行再発大腸がん	FOLFOXIRI
投与予定	休薬を含めて1クール 14日	施行可能な限り



薬品名	申請投与量	計算量	実際の投与量	薬価最小組み合わせ
イリノテカン	165 mg/m <sup>2</sup>	#REF! mg/body	mg/body	内 40mg 0mg 100mg 0mg
レボホリナート	200 mg/m <sup>2</sup>	#REF! mg/body	mg/body	内 25mg 0mg 100mg 0mg
オキサリプラチン	85 mg/m <sup>2</sup>	#REF! mg/body	mg/body	
5-FU(48時間点滴)	3200 mg/m <sup>2</sup>	#REF! mg/body	mg/body	内 250mg 0mg 1000mg 0mg

併用内服薬	用量(1日量)	用法	投与期間
デキサメタゾン	8mg	分2 朝昼食後	day2～4(1～12クール)
アプレピタント	125mg	イリノテカン投与60分前までに内服	day1(1～12クール)
アプレピタント	80mg	分1 朝食後	day2,3(1～12クール)
患者の状態に合わせて下記の内服を処方することがある			
炭酸水素ナトリウム	1.5g	分3 毎食間	day1～4 (1～12クール)
酸化マグネシウム	2.0g	分3 毎食後	
ウルソデオキシコール酸	300mg		
メクロプラミド	15mg		

備考