

がん化学療法個人計画書

患者の状態により輸液の内容・量及び投与速度を変更する場合があります。

科名	適応がん種	レジメン名
	ホジキン病	ABVD
投与予定	休薬を含めて1クール 28 日	6 クール施行

Rp	薬品名	申請投与量	計算量	実際の投与量	手技・用法	投与時間	投与日(day -)					
							1	15				
1	生食 パロノセトロン デキサメタゾン	100ml 0.75mg 3.3~6.6mg			点滴静注	30分	↓	↓				
2	生食 ドキシソルピシン	100ml 25 mg/m ²	#REF! mg/body	mg/body	点滴静注	5分	↓	↓				
3	生食 ビンブラステチン	100ml 6 mg/m ²	#REF! mg/body	mg/body	点滴静注	5分	↓	↓				
4	生食 ブレオマイシン	100ml 10 mg/m ²	#REF! mg/body	mg/body	点滴静注	5分	↓	↓				
5	生食 ダカルバジン	250ml 375 mg/m ²	#REF! mg/body	mg/body	点滴静注	60分	↓	↓				
6	生食	50ml			点滴静注	5分	↓	↓				

Rp	薬品名	薬価最小組み合わせ	備考
2	ドキシソルピシン		[総投与量]500mg/m ² を超えないこと
4	ブレオマイシン		[総投与量]300mgを超えないこと
5	ダカルバジン		遮光

デキサメタゾンを使用しない場合あり

備考

併用内服薬	用量(1日量)	用法	投与期間
アプレピタント	125mg	ダカルバジン投与 60分~90分前	day1、15
アプレピタント	80mg	分1 朝食後	day2、3、16、17