

がん化学療法個人計画書

患者の状態により輸液の内容・量及び投与速度を変更する場合があります。

科名	適応がん種	レジメン名
	多発性骨髄腫	Kd(週1回)
投与予定	休薬を含めて1クール 28 日 効果ある限り 継続	

Rp	薬品名	申請投与量	計算量	実際の投与量	手技・用法	投与時間	投与日(day -)		
							1	8	15
1	生食 (ルートキープ)	50ml			点滴静注	5分	↓	↓	↓
★プライミングフラッシュ5%ブドウ糖液必要★									
	5%ブドウ糖液 +	100ml							
1クール目のDay1のみ									
2	カルフィルゾミブ	20	#REF!	mg/body	点滴静注	30分	↓	↓	↓
	溶解用蒸留水	100ml規格で	→	実際の投与量 ml					
1クール目のDay8以降									
	カルフィルゾミブ	70	#REF!	mg/body					
	溶解用蒸留水	100ml規格で	→	実際の投与量 ml					

Rp	薬品名	薬価最小组み合わせ	備考		
2	カルフィルゾミブ	1クール目のDay1	10mg1v(は5ml) 40mg1v(は20ml)の注射用水で溶解し、必要量を5%ブドウ糖液に混合する。(配合変化を起こすので生食等では希釈しない)		
		内		10mg	0mg
		訳		40mg	0mg
		1クール目のDay8以降			
		内	10mg	0mg	
		訳	40mg	0mg	

体表面積が2.2m²を超える患者では、体表面積2.2m²として投与量を算出すること。

※カルフィルゾミブ投与日のデキサメタゾンはカルフィルゾミブ投与の4時間～30分前に内服。

デキサメタゾンの用量・投与期間は、患者の状態で変更する場合があります。

併用内服薬	用量(1日量)	用法	投与期間
デキサメタゾン (レナデックス)	40mg	分1朝食後※	day1、8、15、22

備考	
----	--