


患者の状態により輸液の内容・量及び投与速度を変更する場合があります。

科名	適応がん種	レジメン名
	非小細胞肺癌 (非扁平上皮癌)	CBDCA+PEM +ベバシズマブ
投与予定	休薬を含めて1クール21日4クール施行、以降PEM+ベバシズマブ	



薬品名	申請投与量	計算量	実際の投与量	薬価最小組み合わせ	備考
ペトレキセド	500 mg/m <sup>2</sup>	#REF! mg/body	mg/body	内 100mg: 0mg 訳 500mg: 0mg	
カルボプラチン	AUC=6	#REF! mg/body	mg/body	内 150mg: 0mg 訳 450mg: 0mg	男性投与量
		#REF! mg/body	mg/body	内 150mg: 0mg 訳 450mg: 0mg	女性投与量
ベバシズマブ	15 mg/kg	#REF! mg/body	mg/body	内 100mg: 0mg 訳 400mg: 0mg	

併用内服薬	用量(1日量)	用法	投与期間
ビタミンB12	1000 μg	筋注	初回投与の少なくとも7日前に投与。投与期間中及び投与中止後22日目まで9週ごと(3コースごと)に1回投与
葉酸	0.5mg	1日1回内服	初回投与の7日以上前から連日投与 最終投与日から22日目まで可能な限り連日投与
アプレピタント	125mg	カルボプラチン投与60分前までに内服	day1
アプレピタント	80mg	分1 朝食後	day2、3
デキサメタゾン	8mg	分2 朝昼食後	day2~4