


がん化学療法個人計画書

患者の状態により輸液の内容・量及び投与速度を変更する場合があります。

| | | |
|------|-------------------------|-------|
| 科名 | 適応がん種 | レジメン名 |
| | 卵巣癌 | GC |
| 投与予定 | 休薬を含めて1クール 21 日 6 クール施行 | |



| 薬品名 | 申請投与量 | 計算量 | 実際の投与量 | 薬価最小組み合わせ | 備考 |
|----------------|------------------------|---------------|---------|------------------------------|---|
| ゲムシタビン | 1000 mg/m ² | #REF! mg/body | mg/body | 内訳 200mg: 0mg 1000mg: 0mg | 患者の状態に合わせて800~1000mg/m ² で使用 |
| カルボプラチン | AUC=4 | #REF! mg/body | mg/body | 内訳 150mg: 0mg 450mg: 0mg | 男性投与量 患者の状態に合わせてAUC=4~5で使用 |
| | | #REF! mg/body | mg/body | 内訳 150mg: 0mg 450mg: 0mg | 女性投与量 患者の状態に合わせてAUC=4~5で使用 |

| 併用内服薬 | 用量(1日量) | 用法 | 投与期間 |
|---------|---------|--------------------|--------|
| アプレピタント | 125mg | ゲムシタビン 投与60分前までに内服 | day1 |
| アプレピタント | 80mg | 分1 朝食後 | day2、3 |
| デキサメタゾン | 4mg | 分2 朝昼食後 | day2、3 |