卵巣がん-012

がん化学療法個人計画書

患者の状態により輸液の内容・量及び投与速度を変更する場合があります。

科名	適応がん種	レジメン名
	悪性卵巣胚細胞腫瘍	BEP
投与予定	休薬を含めて 1クール　21　日　3～4　クール施行	

day1 2 3 4 5 day9 day16 day21

1クール21日

Day1～5

点滴静注　120分
生食　500ml

アプレピタント内服
症状により
day4、5あり

点滴静注　30分
グラニセトロンバック3mg
100ml
デキサメタゾン　9.9mg
ファモチジン　20mg

ブレオマイシンは
Day2のみ

点滴静注 30分
生食　100ml
ブレオマイシン
20mg/㎡

点滴静注　120分
生食　500ml
エトポシド　100mg/㎡

点滴静注　5分
生食　50ml

★プライミング・フラッシュ 生食必要★

点滴静注　120分
生食　250ml
シスプラチン　20mg/㎡

点滴静注　120分
生食　500ml
メトクロプラミド 10mg
フロセミド　20mg

点滴静注　120分
生食　500ml

点滴静注　120分
生食　500ml

Day9

点滴静注　5分
生食　50ml

点滴静注 30分
生食　100ml
ブレオマイシン
20mg/㎡

点滴静注　10分
生食　50ml

Day16

Day9と同内容

併用内服薬	用量(1日量)	用法	投与期間
アプレピタント	125mg	前投薬前	day1
アプレピタント	80mg	分1朝食後	day2.3
アプレピタント80mgは症状によりday4.5にも使用			
備考			

薬品名	申請投与量	計算量	実際の投与量	薬価最小組み合わせ	備　考
シスプラチン	20 mg/㎡	#REF! mg/body	mg/body	内訳 10mg 0mg / 50mg 0mg	
エトポシド	100 mg/㎡	#REF! mg/body	mg/body		*溶解液量に注意
ブレオマイシン	20 mg/㎡	#REF! mg/body	mg/body		