


がん化学療法個人計画書

患者の状態により輸液の内容・量及び投与速度を変更する場合があります。

科名	適応がん種	レジメン名
	肺癌	Nab-PTX+ゲムシタビン
投与予定	休薬を含めて1クール	28日 施行可能な限り



Day1

点滴静注 30分
 グラニセトロンバッグ3mg 100ml
 デキサメタゾン 9.9mg

点滴静注 5分
 生食 50ml

★プライミング・フラッシュ 生食必要★

点滴静注 30分
 生食100ml 実際に投与する液量
 (下記の計算量を参照)

Nab-PTX 125mg/m²

↓

点滴静注 30分
 生食 100ml
ゲムシタビン
1000mg/m²

点滴静注 5分
 生食 50ml

Day8

 Day1と
同内容

Day15

 Day1と
同内容

Nab-PTXは抗がん剤である
と同時に血液製剤であり、
処方とは別で、事前に施行日毎に
血液製剤伝票が必要

Nab-PTXの投与にあたっては、
インラインフィルターを使用しない
こと。
アルブミンのため目詰まりする。

パクリタキセルと異なり
点滴セットの制限はない

有害事象発現(特に好中球減少、血小板
減少、高度な末梢神経障害)時の用量調
節目安あり

薬品名	申請投与量	計算量	実際の投与量	薬価最小組み合わせ
ゲムシタビン	1000 mg/m ²	#REF! mg/body	mg/body	内 200mg 0mg 訳 1000mg 0mg
Nab-PTX	125 mg/m ²	#REF! mg/body	mg/body	
実際に投与する液量	生食100mlで	0 ml	←	

併用内服薬	用量(1日量)	用法	投与期間
デキサメタゾン	8mg	分2 朝昼食後	day2、3 9、10 16、17

備考	
----	--