


# がん化学療法個人計画書

患者の状態により輸液の内容・量及び投与速度を変更する場合があります。

科名	適応がん種	レジメン名
	膵癌	ゲムシタビン+S-1 (術前補助化学療法)
投与予定	休薬を含めて1クール 21 日	2クール施行



Day1・8

点滴静注 30分  
グラニセトロンバッグ3mg  
100ml  
デキサメタゾン 9.9mg

点滴静注 30分  
生食 100ml  
**ゲムシタビン**  
**1000mg/m<sup>2</sup>**

点滴静注 5分  
生食 50ml

S-1			
1.25m <sup>2</sup> 未満	80mg/body/日	1日2回朝夕食後	2週間投与 1週間休薬
1.25~1.5m <sup>2</sup> 未満	100mg/body/日		
1.5m <sup>2</sup> 以上	120mg/body/日		

備考

薬品名	申請投与量	計算量	実際の投与量	薬価最小組み合わせ	備考
ゲムシタビン	1000 mg/m <sup>2</sup>	#REF! mg/body	mg/body	内訳 200mg 0mg 1000mg 0mg	記載投与量は1日の投与量 ・CCr=50~60mL/minでは20mg/day 減量(CCr<50mL/minは臨床試験に おいて投与経験がない)
S-1	レジメン登録時のS-1投与基準量 は上記表参照		mg/body		

併用内服薬	用量(1日量)	用法	投与期間
デキサメタゾン	8mg	分2朝昼食後	day2、3、9、10