


がん化学療法個人計画書

患者の状態により輸液の内容・量及び投与速度を変更する場合があります。

科名	適応がん種	プロトコール名
	尿路上皮癌	GC
投与予定	休薬を含めて1クール 28 日 1~4 クール施行	



1クール28日 1~4クール施行

Day1

点滴静注 30分
 生食 100ml
 デキサメタゾン 6.6mg

点滴静注 30分
 生食 100ml
ゲムシタビン
1000mg/m²

点滴静注 5分
 生食 50ml

Day2

アプレピタント 125mg 内服

点滴静注 4時間
 生食 1000ml

点滴静注 30分
 生食 100ml
 パロノセトロン 0.75mg
 デキサメタゾン 9.9mg
 ファモチジン 20mg

★プライミング・フラッシュ 生食必要★

点滴静注 120分
 生食 250ml
シスプラチン 70mg/m²

フロセミド 静注 20mg

点滴静注 4時間
 生食 1000ml

Day3

点滴静注 4時間
 生食 1000ml

Day4

点滴静注 4時間
 生食 1000ml

Day8

Day1と
 同内容

Day15

Day1と
 同内容

備考

薬品名	申請投与量	計算量	実際の投与量	薬価最小組み合わせ
ゲムシタビン	1000 mg/m ²	#REF! mg/body	mg/body	内 200mg 0mg 訳 1000mg 0mg
シスプラチン	70 mg/m ²	#REF! mg/body	mg/body	内 10mg 0mg 訳 50mg 0mg

併用内服薬	用量(1日量)	用法	投与期間
アプレピタント	125mg	シスプラチン 投与60分前までに内服	day2
アプレピタント	80mg	分1 朝食後	day3、4
デキサメタゾン	8mg	分2 朝昼食後	day3~5