

PhALL-004

がん化学療法個人計画書

患者の状態により輸液の内容・量及び投与速度を変更する場合があります。

科名	適応がん種	レジメン名
	Ph+ALL	MRD2019維持(P-M)
投与予定	休薬を含めて1クール 28日 2年間 施行	

Rp	薬品名	申請投与量	計算量	実際の投与量	手技・用法	投与時間	投与日(day -)					
							1					
1	生食 メクロプラミド	100ml 10mg	#REF! mg/body	mg/body	点滴静注	30分	↓					
	プレドニゾン	60 mg/m ²										
	生食 ビンクリスチン	50ml 1.3 mg/m ²					#REF! mg/body	mg/body	点滴静注	15分	↓	
3	生食	50ml			点滴静注	5分	↓					

Rp	薬品名	薬価最小組み合わせ	備考
1	プレドニゾン		1日最大100mg/body
2	ビンクリスチン		1回投与量は最大2mg/bodyを超えない

ポナチニブは、MRD陰性から陽性、もしくは1log以上の増悪を認めた場合、最大45mg/day、1日1回まで増量した維持療法を許容する。

day1のプレドニゾロンは内服へ変更の場合あり。

併用内服薬	用量(1日量)	用法	投与期間
プレドニゾン	60mg/m ² (最大100mg/body)	分1朝食後又は分2朝昼食後	day2~5
ポナチニブ	MRD陽性: 30mg MRD陰性: 15mg	分1 朝食後	day1~28

備考	
----	--