

がん化学療法個人計画書

患者の状態により輸液の内容・量及び投与速度を変更する場合があります。

科名	適応がん種	プロトコール名
	結腸・直腸癌	ベバシズマブ+XELOX
投与予定	休薬を含めて1クール 21 日 可能な限り施行	



Day1

点滴静注 5分
生食 50ml

点滴静注 ※90分
生食バッグ 100ml
ベバシズマブ 7.5mg/kg

点滴静注 30分
グラニセトロンバッグ3mg 100ml
デキサメタゾン 9.9mg
d-クロルフェニラミン 5mg
ファモチジン 20mg

★プライミング・フラッシュ 5%ブドウ糖液必要★

点滴静注 120分
5%ブドウ糖液 250ml
オキサリプラチン
130mg/m²

※初回投与の忍容性が良好であれば、2回目は60分間、2回目においても忍容性が良好であれば、以降は30分間

有害事象により休薬・減量又は中止する場合には、有害事象の症状・重症度等に応じた減量・休薬の基準があるので注意すること

備考

カペシタビン(2000mg/m ² /日)			
1.36m ² 未満	2400mg/body/日	1日2回朝夕食後	14日間投与 7日間休薬
1.36~1.66m ² 未満	3000mg/body/日		
1.66~1.96m ² 未満	3600mg/body/日		
1.96m ² 以上	4200mg/body/日		

薬品名	申請投与量	計算量	実際の投与量	薬価最小組み合わせ	備考
ベバシズマブ	7.5 mg/kg	#REF! mg/body	mg/body	内 100mg 0mg 訳 400mg 0mg	
オキサリプラチン	130 mg/m ²	#REF! mg/body	mg/body		
カペシタビン	プロトコール登録時のカペシタビン投与基準量は上記表参照		mg/body		記載投与量は1日の投与量

併用内服薬	用量(1日量)	用法	投与期間