

# がん化学療法個人計画書

患者の状態により輸液の内容・量及び投与速度を変更する場合があります。

|      |                |                           |
|------|----------------|---------------------------|
| 科名   | 適応がん種          | レジメン名                     |
|      | 食道癌            | ペムプロリズマブ + FP<br>(1~6クール) |
| 投与予定 | 休薬を含めて1クール 21日 | 最大 6クール施行                 |



**Day1**

アプレピタント 125mg 内服

点滴静注 5分  
生食 50ml

点滴静注 60分  
生食 500ml  
KCL 10mEq  
硫酸Mg 10mEq

点滴静注 30分  
生食バッグ 100ml  
**\*ペムプロリズマブ  
200mg/body**

点滴静注 30分  
15%マンニトール 250ml

点滴静注 5分  
生食 50ml

**★プライミング・フラッシュ生食必要★**

持続点滴 24時間  
生食 1000ml  
5-FU 800mg/m<sup>2</sup>

点滴静注 60分  
生食 250ml  
シスプラチン  
80mg/m<sup>2</sup>

点滴静注 30分  
生食 100ml  
パロノセトロン 0.75mg  
デキサメタゾン 9.9mg

点滴静注 60分  
生食 500ml  
KCL 10mEq

**Day2~5**

持続点滴 24時間  
生食 1000ml  
5-FU 800mg/m<sup>2</sup>

**\*ペムプロリズマブの投与にあたっては、インラインフィルター(0.2又は0.22ミクロン)を使用すること。**

・食事状況により生食を高カロリー輸液に変更する場合あり  
・水分負荷は年齢・心腎機能により調整

備考

| 薬品名      | 申請投与量                 | 計算量           | 実際の投与量  | 薬価最小組み合わせ                   |
|----------|-----------------------|---------------|---------|-----------------------------|
| ペムプロリズマブ | 200 mg/body           |               | mg/body |                             |
| 5-FU     | 800 mg/m <sup>2</sup> | #REF! mg/body | mg/body | 内 250mg 0mg<br>訳 1000mg 0mg |
| シスプラチン   | 80 mg/m <sup>2</sup>  | #REF! mg/body | mg/body | 内 10mg 0mg<br>訳 50mg 0mg    |

| 併用内服薬   | 用量(1日量) | 用法                | 投与期間   |
|---------|---------|-------------------|--------|
| アプレピタント | 125mg   | シスプラチン投与60分前までに内服 | day1   |
| アプレピタント | 80mg    | 分1 朝食後            | day2、3 |
| デキサメタゾン | 8mg     | 分2 朝昼食後           | day2~5 |