

がん化学療法個人計画書

患者の状態により輸液の内容・量及び投与速度を変更する場合があります。

科名	適応がん種	レジメン名
	多発性骨髄腫	ボルテゾミブ単独
投与予定	休薬を含めて1クール 21 日 8 クール施行	

	Rp	薬品名	申請投与量	計算量	実際の投与量	手技・用法	投与時間	投与日(day -)			
								1	4	8	11
<input type="checkbox"/> 皮下注 <input type="checkbox"/> 静注	1	ボルテゾミブ 生食 (1vを生食1.2mlで溶解)	1.3 mg/m ²	#REF! mg/body	実際の投与量 mg/body	皮下注	/	↓	↓	↓	↓
	2	ボルテゾミブ 生食 (1vを生食3mlで溶解)	1.3 mg/m ²	#REF! mg/body	実際の投与量 ml	静注	/	↓	↓	↓	↓
	3	生食	50ml	/	/	点滴静注	5分	↓	↓	↓	↓

Rp	薬品名	薬価最小組み合わせ	備考
1・2	ボルテゾミブ		皮下注射の場合、1vを生食1.2mlで溶解する。静注の場合、1vを生食3mlで溶解する。 皮下注: 投与部位は左右の大腿部、腹部に交互に投与するなど注射部位を替えて行う

8サイクルを超えて継続投与する場合には上記の用法・用量で投与を継続するか、又は維持療法として週1回、4週間(1、8、15、22日目)投与した後、13日間休薬(23～35日目)する。この5週間で1サイクルとし投与を繰り返す。

投与日程・投与量は患者の状態で変更あり。

併用内服薬	用量(1日量)	用法	投与期間
デキサメタゾン(レナデックス)	20mg	分1朝食後	day1,2,4,5,8,9,11,12

備考	
----	--