

がん化学療法個人計画書

患者の状態により輸液の内容・量及び投与速度を変更する場合があります。

| | | |
|------|------------------|---------|
| 科名 | 適応がん種 | レジメン名 |
| | 多発性骨髄腫 | DMVM |
| 投与予定 | 休薬を含めて 1クール 28 日 | 3 クール施行 |

| Rp | 薬品名 | 申請投与量 | 計算量 | 実際の投与量 | 手技・用法 | 投与時間 | 投与日(day -) | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------------|--------------------------------|------------------|---------|-------|------|------------|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|--|--|--|--|
| | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 10 | 11 | 12 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
| 1 | 生食 デキサメタゾン | 100ml 39.6mg/body | / | | 点滴静注 | 30分 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | | | | | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | | | | |
| 2 | 生食 ビンクリスチン | 100ml 1.2 mg/m ² | #REF! mg/body | mg/body | 点滴静注 | 30分 | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 生食 ラニムスチン | 100ml 70 mg/body | / | mg/body | 点滴静注 | 30分 | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 生食 | 50ml | / | | 点滴静注 | 5分 | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Rp | 薬品名 | 薬価最小组み合わせ | 備考 |
|----|---------|-----------|-----------------------|
| 2 | ビンクリスチン | | 1回投与量は最大2mg/bodyを超えない |
| 3 | ラニムスチン | | 溶解後遮光 |

デキサメタゾンは内服に変更の場合あり

| 併用内服薬 | 用量(1日量) | 用法 | 投与期間 |
|--------|---------|--------|--------|
| メルファラン | 12mg | 分1 朝食後 | day1~6 |

| | |
|----|--|
| 備考 | |
|----|--|