

がん化学療法個人計画書

患者の状態により輸液の内容・量及び投与速度を変更する場合があります。

科名	適応がん種	レジメン名
	多発性骨髄腫	CyBorD
投与予定	休薬を含めて1クール 28 日 4 クール施行	

	Rp	薬品名	申請投与量	計算量	実際の投与量	手技・用法	投与時間	投与日(day -)			
								1	8	15	22
<input type="checkbox"/>	皮下注	1 ボルテゾミブ 生食 (1vを生食1.2mlで溶解)	1.3 mg/m ²	#REF! mg/body	mg/body 実際の投与量 ml	皮下注	/	↓	↓	↓	↓
<input type="checkbox"/>	静注	1 生食	50ml	/	/	点滴静注	5分	↓	↓	↓	↓
		2 ボルテゾミブ 生食 (1vを生食3mlで溶解)	1.3 mg/m ²	#REF! mg/body	mg/body 実際の投与量 ml	静注	/	↓	↓	↓	↓
		3 生食	50ml	/	/	点滴静注	5分	↓	↓	↓	↓

Rp	薬品名	薬価最小組み合わせ	備考
1・2	ボルテゾミブ		皮下注射の場合、1vを生食1.2mlで溶解する。静注の場合、1vを生食3mlで溶解する。 皮下注：投与部位は左右の大腿部、腹部に交互に投与するなど注射部位を替えて行う

投与日程・投与量は患者の状態に変更あり。

併用内服薬	用量(1日量)	用法	投与期間
シクロホスファミド	300mg/m ²	分1夕食後	day1、8、15、22
デキサメタゾン (レナデックス)	40mg	分1朝食後	(1、2クール目) day1~4、9~12、17~20 (3、4クール目) day1、8、15、22

備考