

がん化学療法個人計画書

患者の状態により輸液の内容・量及び投与速度を変更する場合があります。

科名	適応がん種	レジメン名
	再発・難治性、CD30陽性の末梢性T細胞リンパ腫	ブレンツキシマブベドチン単独
投与予定	休薬を含めて1クール 21日 可能な限り施行	

Rp	薬品名	申請投与量	計算量	実際の投与量	手技・用法	投与時間	投与日(day -)				
							1				
1	生食	50ml	/		点滴静注	5分	↓				
2	生食 ブレンツキシマブベドチン 溶解用の蒸留水	100ml 1.8 mg/kg	#REF! mg/body	mg/body 実際の投与量 ml	点滴静注	30分	↓				
3	生食	50ml	/		点滴静注	5分	↓				
4											
5											

Rp	薬品名	薬価最小組み合わせ	備考
2	ブレンツキシマブベドチン		1vを注射用水10.5mlで溶解する。 (5mg/mlとなる) 最終濃度が0.4~1.2mg/mlとなるように生食または5%ブドウ糖液で希釈する。

ブレンツキシマブベドチンは体重が100kgを超える場合は、100kgとして計算する。
末梢神経障害のgradeに応じて減量・休薬・中止の規定あり。

併用内服薬	用量(1日量)	用法	投与期間

備考	
----	--