非小細胞肺癌-006

がん化学療法個人計画書

患者の状態により輸液の内容・量及び投与速度を変更する場合があります。

科名	適応がん種	レジメン名
	非小細胞肺癌	CBDCA＋PTX＋ペムブロリズマブ
投与予定	休薬を含めて 1クール 21日 4クール　施行、以降ペムブロリズマブ単独	

day1　day8　day15　day21

Day1

アプレピタント 125mg 内服

ジフェンヒドラミン 50mg 内服

点滴静注　30分
生食　100ml

点滴静注　5分
生食　50ml

★プライミング・フラッシュ
生食必要★

インラインフィルター使用

点滴静注　30分
生食バッグ　100ml
＊ペムブロリズマブ
200mg/body

点滴静注　5分
生食　50ml

インラインフィルター使用

点滴静注　180分
生食　500ml
＊パクリタキセル
200mg/㎡

点滴静注　60分
生食　250ml
カルボプラチン
AUC=6

点滴静注　30分
生食　100ml
パロノセトロン　0.75mg
デキサメタゾン　16.5mg
ファモチジン　20mg

5クール目以降Day1

点滴静注　5分
生食　50ml

インラインフィルター使用

点滴静注　30分
生食バッグ　100ml
＊ペムブロリズマブ
200mg/body

点滴静注　5分
生食　50ml

1クール21日

＊ペムブロリズマブ
＊パクリタキセル
インラインフィルター（0.2又は0.22μm）を使用して投与

・本レジメンにおける体表面積は藤本の式で計算。又、GFRに関してはCalvert式のGFRをJelliffeの式から計算。

備考

薬品名	申請投与量	計算量	実際の投与量	薬価最小組み合わせ			備　考
ペムブロリズマブ	200 mg/body		mg/body				
パクリタキセル	200 mg/㎡	#REF! mg/body	mg/body	内訳	30mg	0mg	
					100mg	0mg	
カルボプラチン	AUC=6	#REF! mg/body	mg/body	内訳	150mg	0mg	男性投与量
					450mg	0mg	
		#REF! mg/body	mg/body	内訳	150mg	0mg	女性投与量
					450mg	0mg	

併用内服薬	用量（1日量）	用法	投与期間
ジフェンヒドラミン	50mg	パクリタキセル投与30分前までに内服	day1（4クール目で終了）
アプレピタント	125mg	カルボプラチン投与60分前までに内服	day1（4クール目で終了）
アプレピタント	80mg	分1　朝食後	day2、3（4クール目で終了）
デキサメタゾン	8mg	分2　朝昼食後	day2～4（4クール目で終了）