がん化学療法個人計画書 患者の状態により輸液の内容・量及び 投与速度を変更する場合があります。

科名 CBDCA+weekly PTX 非小細胞肺癌 +ベバシズマブ 投与予定 休薬を含めて 1クール28日4~6クール施行、以降ベバシズマブ単独

day8 day1

Dav1

アプレピタント 125mg 内服

ジフェンヒドラミン 50mg 内服

点滴静注 30分 生食 100ml パロノセトロン 0.75mg デキサメタゾン 9.9mg ファモチジン 20mg

> 点滴静注 30分 生食 100ml

★プライミング・フラッシュ 生食必要★

点滴静注 60分 生食 250ml パクリタキセル 70mg/㎡

点滴静注 60分 生食 250ml カルボプラチン AUC=5

点滴静注 ※90分 生食バッグ 100ml ベバシズマブ 15mg/kg

> 点滴静注 5分 生食 50ml

Day8

day15

ジフェンヒドラミン 50mg 内服

点滴静注 30分 生食 100ml デキサメタゾン 8.25mg→6.6mg ファモチジン 20mg

> 点滴静注 30分 生食 100ml

★プライミング・フラッシュ 生食必要★

点滴静注 60分 生食 250ml パクリタキセル 70mg/㎡

4~6クール終了後3週毎(原則) 可能な限りベバシズマブ単独

> 点滴静注 5分 生食 50ml

点滴静注 ※90分 生食バッグ 100ml ベバシズマブ 15mg/kg

> 点滴静注 5分 生食 50ml

day22

day28 1クール28日

Day15

Day8 同内容

・本レジメンにおける体表面積は藤本 の式で計算。

又、GFRに関してはCalvert式のGFRを Jelliffeの式から計算。

○放射線療法については、原則行わな

○デキサメタゾン患者の状態に合わせ て6.6mgまで減量可。

※パクリタキセルの投与時には0.22ミ クロン以下メンブランフィルターを用い たインラインフィルターを通して投与す ること

※初回投与の忍容性が良好であれば、 2回目は60分。2回目においても忍容性 が良好であれば、それ以降は30分。

備考

| 薬品名 | 申請投与量 | 計算量 | 実際の投与量 | 薬 | 価最小約 | 且み合わせ | 備考 |
|---------|----------------------|------------------|---------|--------|----------------|-------|-----------------------------------|
| パクリタキセル | 70 mg/m ² | #REF! mg/body | mg/body | 内 訳 | 30mg 100mg | | 患者の状態に合わせて60~70mg/ ㎡で使用 |
| カルボプラチン | AUC=5 | #REF! mg/body | mg/body | 内訳 | 150mg | | 男性投与量 患者の状態に合わせてAUC=5 ~6で使用 |
| | | | | | 450mg | 0mg | |
| | | #REF! | | 内 | 150mg | | 女性投与量 患者の状態に合わせてAUC=5 |
| | | mg/body | mg/body | 訳 | 450mg | 0mg | ~6で使用 |
| ベバシズマブ | 15 mg/kg | #REF! mg/body | mg/body | 内訳 | 100mg 400mg | | |

| 併用内服薬 | 用量(1日量) | 用法 | 投与期間 |
|-----------|---------|--------------------|-----------|
| ジフェンヒドラミン | 50mg | パクリタキセル投与30分前までに内服 | day1、8、15 |
| アプレピタント | 125mg | カルボプラチン投与60分前までに内服 | day1 |
| アプレピタント | 80mg | 分1 朝食後 | day2、3 |
| デキサメタゾン | 8mg | 分2 朝昼食後 | day2∼4 |