


がん化学療法個人計画書

患者の状態により輸液の内容・量及び投与速度を変更する場合があります。

科名	適応がん種	プロトコール名
	尿路上皮癌	PG
投与予定	休薬を含めて1クール 28日 1~6クール施行	



Day1

ジフェンヒドラミン 50mg 内服

点滴静注 30分
 生食 100ml
 デキサメタゾン 8.25mg
 ファモチジン 20mg

点滴静注 30分
 生食 100ml

★プライミング・フラッシュ 生食必要★

点滴静注 180分
 生食 500ml
 パクリタキセル
 110mg/m²

点滴静注 30分
 生食 100ml
 ゲムシタビン
 1000mg/m²

点滴静注 5分
 生食 50ml

1クール28日 1~6クール施行

Day8

Day1と
同内容

Day15

Day1と
同内容

パクリタキセル投与時には
0.22ミクロン以下のメンブラン
フィルターを用いたインライン
フィルターを通して投与すること

備考

薬品名	申請投与量	計算量	実際の投与量	薬価最小組み合わせ
パクリタキセル	110 mg/m ²	#REF! mg/body	mg/body	内 30mg 0mg 訳 100mg 0mg
ゲムシタビン	1000 mg/m ²	#REF! mg/body	mg/body	内 200mg 0mg 訳 1000mg 0mg

併用内服薬	用量(1日量)	用法	投与期間
ジフェンヒドラミン	50mg	パクリタキセル 点滴の約30分前	day1、8、15