

がん化学療法個人計画書

患者の状態により輸液の内容・量及び投与速度を変更する場合があります。

科名	適応がん種	レジメン名
	胆道癌	ゲムシタビン+S-1
投与予定	休薬を含めて1クール 21 日 施行可能な限り	



Day8

点滴静注 30分
 グラニセロンバッグ3mg 100ml
 デキサメタゾン 9.9mg

点滴静注 30分
 生食 100ml
ゲムシタビン
1000mg/m²

点滴静注 5分
 生食 50ml

Day15

**Day8と
同内容**

S-1 (60mg/m ² /日)			
1.25m ² 未満	60mg/body/日	1日2回朝夕食後	2週間投与 1週間休薬
1.25~1.5m ² 未満	80mg/body/日		
1.5m ² 以上	100mg/body/日		

備考

薬品名	申請投与量	計算量	実際の投与量	薬価最小組み合わせ	備考
ゲムシタビン	1000 mg/m ²	#REF! mg/body	mg/body	内訳	初回は半量で施行する場合あり
				200mg	
S-1	レジメン登録時のS-1投与基準量 は上記表参照	mg/body	mg/body	1000mg	0mg
				記載投与量は1日の投与量	

併用内服薬	用量(1日量)	用法	投与期間
デキサメタゾン	8mg	分2 朝昼食後	day9、10、16、17