


がん化学療法個人計画書

患者の状態により輸液の内容・量及び投与速度を変更する場合があります。

科名	適応がん種	レジメン名
	治療切除不能な胆道癌	デュルバルマブ+GC
投与予定	休業を含めて1クール21日 最大8クール施行 以降デュルバルマブ単独 4週間間隔 可能な限り施行	



1クール21日
最大8クール施行
以降デュルバルマブ単独
4週間間隔

デュルバルマブの投与にあたっては、
インラインフィルター(0.2又は0.22ミク
ロン)を使用すること。

4週間間隔
(GC併用終了後)

点滴静注 5分
生食 50ml

点滴静注 60分
生食バッグ 100ml
*デュルバルマブ
1500mg/body

点滴静注 5分
生食 50ml

備考

薬品名	申請投与量	計算量	実際の投与量	薬価最小組み合わせ	備考
デュルバルマブ	1500 mg/body		mg/body		体重30kg以下の場合の1回投与量は20mg/kgとする。
シスプラチン	25 mg/m ²	#REF! mg/body	mg/body	内訳 10mg 0mg 50mg 0mg	
ゲムシタピン	1000 mg/m ²	#REF! mg/body	mg/body	内訳 200mg 0mg 1000mg 0mg	
併用内服薬	用量(1日量)	用法		投与期間	
アプレピタント	125mg	シスプラチン投与60分前までに内服		day 1、8	
アプレピタント	80mg	分1 朝食後		day2、3、9、10	