


がん化学療法個人計画書

患者の状態により輸液の内容・量及び投与速度を変更する場合があります。

科名	適応がん種	プロトコール名
	HER2陽性の手術不能又は再発乳癌	ペルツズマブ+トラスツズマブ+カペシタピン
投与予定	休薬を含めて 1クール 21 日	可能な限り施行



Day1

点滴静注 5分
生食 50ml

点滴静注
※初回:90分 2回目~:基本30分
生食 250ml
トラスツズマブ
初回:8mg/Kg
2回目以降:6mg/Kg

点滴静注
◎初回:60分 2回目~:基本30分
生食 250ml
ペルツズマブ
初回:840mg/body
2回目以降:420mg/body

点滴静注 5分
生食 50ml

カペシタピン			
1.36㎡未満	2400mg/body/日	1日2回朝夕食後	14日間投与 7日間休薬
1.36~1.66㎡未満	3000mg/body/日		
1.66~1.96㎡未満	3600mg/body/日		
1.96㎡以上	4200mg/body/日		

☆2回目以降のトラスツズマブ投与時間:基本30分
患者の年齢・状態により
2回目 60分、3回目以降 30分や 2回目以降 60分
で施行する場合もあり

◎ペルツズマブ:初回投与は60分かけて、なお初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降の投与時間は30分まで短縮出来る

・ペルツズマブ及びトラスツズマブの投与が予定された投与から遅れた場合、前回投与日から6週間未満のときには維持投与量を投与し、6週間以上のときには改めて初回投与量を投与し、次回以降は維持投与量を3週間間隔で投与する

薬品名	申請投与量	計算量	実際の投与量	薬価最小組み合わせ	備考
トラスツズマブ	8 mg/Kg	#REF! mg/body	mg/body	内 60mg: 0mg 150mg: 0mg	初回投与量
	6 mg/Kg	#REF! mg/body	mg/body	内 60mg: 0mg 150mg: 0mg	2回目以降
ペルツズマブ	840 mg/body	/	mg/body		初回投与量
	420 mg/body	/	mg/body		2回目以降
カペシタピン	プロトコール登録時のカペシタピン 投与基準量は上記表参照		mg/body		記載投与量は1日の投与量

備考	
----	--