


がん化学療法個人計画書

患者の状態により輸液の内容・量及び投与速度を変更する場合があります。

科名	適応がん種	プロトコール名
	PD-L1陽性のホルモン受容体陰性かつHER2陰性の手術不能又は再発乳癌	ペムブロリズマブ+パクリタキセル
投与予定	ペムブロリズマブ: 休薬を含めて1クール 21日 パクリタキセル: 休薬を含めて1クール 28日 可能な限り施行	



ペムブロリズマブとパクリタキセルを同日に投与する場合

点滴静注 5分
生食 50ml

点滴静注 30分
生食バッグ 100ml
ペムブロリズマブ 200mg/body

点滴静注 5分
生食 50ml

ジフェンヒドラミン 50mg内服

点滴静注 30分
生食 100ml
デキサメタゾン 8.25→6.6mg
ファモチジン 20mg

点滴静注 30分
生食 100ml

★プライミング・フラッシュ 生食必要★

点滴静注 60分
生食 250ml
パクリタキセル 90mg/m²

パクリタキセルのみ投与する場合

ジフェンヒドラミン 50mg内服

点滴静注 30分
生食 100ml
デキサメタゾン 8.25→6.6mg
ファモチジン 20mg

点滴静注 30分
生食 100ml

★プライミング・フラッシュ 生食必要★

点滴静注 60分
生食 250ml
パクリタキセル 90mg/m²

ペムブロリズマブのみ投与する場合

点滴静注 5分
生食 50ml

点滴静注 30分
生食バッグ 100ml
ペムブロリズマブ 200mg/body

点滴静注 5分
生食 50ml

パクリタキセル・ペムブロリズマブ投与時には、0.22ミクロン以下のメンブランフィルターを用いたインラインフィルターを通して投与すること

・デキサメタゾンは患者の状態に合わせて6.6mgまで減量可

備考

薬品名	申請投与量	計算量	実際の投与量	薬価最小組み合わせ
ペムブロリズマブ	200 mg/body		mg/body	
パクリタキセル	90 mg/m ²	#REF! mg/body	mg/body	内 30mg 0mg 訳 100mg 0mg

併用内服薬	用量(1日量)	用法	投与期間
ジフェンヒドラミン	50mg	パクリタキセル投与30分前までに内服	パクリタキセル投与日