


がん化学療法個人計画書

患者の状態により輸液の内容・量及び投与速度を変更する場合があります。

科名	適応がん種	プロトコール名
	HER2陽性進行・再発乳癌	ペルツズマブ+トラスツズマブ +パクリタキセル
投与予定	休薬を含めて1クール 21 日 可能な限り施行	



パクリタキセル投与時には、0.22ミクロン以下のメンブランフィルターを用いたインラインフィルターを通して投与すること

・デキサメタゾンは患者の状態に合わせて6.6mgまで減量可
 ☆2回目以降のトラスツズマブ投与時間:基本30分
 患者の年齢・状態により2回目60分、3回目以降30分や2回目以降60分で施行する場合もあり
 ◎ペルツズマブ:初回投与は60分かけて、なお初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降の投与時間は30分まで短縮可
 ・ペルツズマブ及びトラスツズマブの投与が予定された投与から遅れた場合、前回投与日から6週間未満のときには維持投与量を投与し、6週間以上のときには改めて初回投与量を投与し、次回以降は維持投与量を3週間間隔で投与する

薬品名	申請投与量	計算量	実際の投与量	薬価最小組み合わせ	備考
トラスツズマブ	8 mg/Kg	#REF! mg/body	mg/body	内 60mg 0mg 訳 150mg 0mg	初回投与量
	6 mg/Kg	#REF! mg/body	mg/body	内 60mg 0mg 訳 150mg 0mg	2回目以降
ペルツズマブ	840 mg/body	/	mg/body		初回投与量
	420 mg/body	/	mg/body		2回目以降
パクリタキセル	80 mg/m ²	#REF! mg/body	mg/body	内 30mg 0mg 訳 100mg 0mg	患者の状態に合わせて70~80mg/m ² で使用

併用内服薬	用量(1日量)	用法	投与期間
ジフェンヒドラミン	50mg	パクリタキセル投与30分前までに内服	day1,8,15

備考