


# がん化学療法個人計画書

患者の状態により輸液の内容・量及び投与速度を変更する場合があります。

科名	適応がん種	プロトコール名
	結腸・直腸癌	イリノテカン A
投与予定	休薬を含めて1クール	28又は35日 施行可能な限り



Day1

点滴静注 30分  
 グラニセロンバック3mg 100ml  
 デキサメタゾン 9.9mg

点滴静注 90分  
 生食 500ml  
 イリノテカン  
 100mg/m<sup>2</sup>

点滴静注 5分  
 生食 50ml

Day8

Day1と  
同内容

Day15

Day1と  
同内容

Day22

Day1と  
同内容

備考

薬品名	申請投与量	計算量	実際の投与量	薬価最小組み合わせ
イリノテカン	100 mg/m <sup>2</sup>	#REF! mg/body	mg/body	内訳 40mg 0mg 100mg 0mg

併用内服薬	用量(1日量)	用法	投与期間
炭酸水素ナトリウム	1.5g	分3 毎食間	day1~4、8~11、 15~18、(22~25)
酸化マグネシウム	2.0g	分3 毎食後	
ウルソデオキシコール酸	300mg		
メクロプラミド	15mg	分2 朝昼食後	day2、3、9、10、16、17 (23、24)
デキサメタゾン	8mg		

・デキサメタゾンを除く併用内服薬は患者の状態に合わせて使用  
 ・患者の状態により内服の5-HT3受容体拮抗剤を処方する場合あり。