


がん化学療法個人計画書

患者の状態により輸液の内容・量及び投与速度を変更する場合があります。

科名	適応がん種	プロトコール名
	結腸・直腸癌	ベバシズマブ+S-1
投与予定	休薬を含めて1クール	21日 可能な限り施行



day1

day8

day15

day21

1クール21日

Day1

点滴静注 5分
生食 50ml

点滴静注 ※90分
生食バッグ 100ml
ベバシズマブ 7.5mg/kg

点滴静注 30分
グラニセトロンバッグ3mg 100ml
デキサメタゾン 9.9mg
d-クロルフェニラミン 5mg
ファモチジン 20mg

★プライミング・フラッシュ 5%ブドウ糖液必要★

点滴静注 120分
5%ブドウ糖液 250ml
オキサリプラチン
130mg/m²

※初回投与の忍容性が良好であれば、2回目は60分間、2回目においても忍容性が良好であれば、以降は30分間

備考

S-1			
1.25m ² 未満	80mg/body/日	1日2回朝夕食後	2週間投与 1週間休薬
1.25~1.5m ² 未満	100mg/body/日		
1.5m ² 以上	120mg/body/日		

薬品名	申請投与量	計算量	実際の投与量	薬価最小組み合わせ	備考
ベバシズマブ	7.5 mg/kg	#REF! mg/body	mg/body	内 100mg: 0mg 訳 400mg: 0mg	
オキサリプラチン	130 mg/m ²	#REF! mg/body	mg/body		
S-1	プロトコール登録時の S-1投与基準量は上記表参照		mg/body		記載投与量は1日の投与量

併用内服薬	用量(1日量)	用法	投与期間