


がん化学療法個人計画書

患者の状態により輸液の内容・量及び投与速度を変更する場合があります。

| | | |
|------|-----------------------|-----------------|
| 科名 | 適応がん種 | プロトコール名 |
| | 結腸・直腸癌 (RAS遺伝子野生型) | パニツムマブ+mFOLFOX6 |
| 投与予定 | 休薬を含めて1クール | 14 日 施行可能な限り |



1クール14日



・パニツムマブ投与中及び投与終了後、少なくとも1時間は観察期間(バイタルサインをモニターする等)を設ける。
・有害事象発現時の用量調節の目安あり

| 備考 |
|----|
| |

| 薬品名 | 申請投与量 | 計算量 | 実際の投与量 | 薬価最小組み合わせ | 備考 |
|--------------|------------------------|---------------|---------|----------------------------|--|
| パニツムマブ | 6 mg/kg | #REF! mg/body | mg/body | | 1回投与量として1,000mgを超える場合は、日局生理食塩液で希釈し約150mLとし、90分以上かけて点滴静注すること。 |
| レボホリナート | 200 mg/m ² | #REF! mg/body | mg/body | 内訳 25mg 0mg 100mg 0mg | |
| オキサリプラチン | 85 mg/m ² | #REF! mg/body | mg/body | | |
| 5-FU(bolus) | 400 mg/m ² | #REF! mg/body | mg/body | 内訳 250mg 0mg 1000mg 0mg | |
| 5-FU(46時間点滴) | 2400 mg/m ² | #REF! mg/body | mg/body | 内訳 250mg 0mg 1000mg 0mg | |

| 併用内服薬 | 用量(1日量) | 用法 | 投与期間 |
|---------|---------|--------|--------|
| デキサメタゾン | 8mg | 分2 朝食後 | day2~3 |