


がん化学療法個人計画書

患者の状態により輸液の内容・量及び投与速度を変更する場合があります。

科名	適応がん種	プロトコール名
	治癒切除不能な進行・再発結腸・直腸癌	ラムシルマブ+FOLFIRI
投与予定	休薬を含めて1クール 14日 施行可能な限り	



ラムシルマブの投与には、0.22ミクロン以下のメンブランフィルターを用いたインラインフィルターを通して投与すること。

備考	
----	--

薬品名	申請投与量	計算量	実際の投与量	薬価最小組み合わせ
ラムシルマブ	8 mg/kg	#REF! mg/body	mg/body	内 100mg 0mg 訳 500mg 0mg
レボホリナート	200 mg/m ²	#REF! mg/body	mg/body	内 25mg 0mg 訳 100mg 0mg
イリノテカン	150 mg/m ²	#REF! mg/body	mg/body	内 40mg 0mg 訳 100mg 0mg
5-FU (bolus)	400 mg/m ²	#REF! mg/body	mg/body	内 250mg 0mg 訳 1000mg 0mg
5-FU (46時間点滴)	2400 mg/m ²	#REF! mg/body	mg/body	内 250mg 0mg 訳 1000mg 0mg

併用内服薬	用量(1日量)	用法	投与期間
デキサメタゾン	8mg	分2 朝食後	day2~4
アプレピタント	125mg	イリノテカン投与60分前までに内服	day1
アプレピタント	80mg	分1 朝食後	day2、3
下記併用内服薬は患者の状態に合わせて使用			
炭酸水素ナトリウム	1.5g	分3 毎食間	day1~4
酸化マグネシウム	2.0g	分3 毎食後	
ウルソデオキシコール酸	300mg		
メトクロプラミド	15mg		