


がん化学療法個人計画書

患者の状態により輸液の内容・量及び投与速度を変更する場合があります。

科名	適応がん種	レジメン名
	食道癌	high dose FP
投与予定	休薬を含めて1クール28日 可能な限り施行 術前化学療法では2クール施行	



Day1

アプレピタント 125mg 内服

持続点滴 24時間
生食 1000ml
5-FU 800mg/m²

点滴静注 30分
15%マンニトール 250ml

↓

★プライミング・フラッシュ 生食必要★

点滴静注 30分
生食 100ml
パロノセトロン 0.75mg
デキサメタゾン 9.9mg

点滴静注 60分
生食 250ml
シスプラチン 80mg/m²

点滴静注 60分
生食 500ml
KCL 10mEq
硫酸Mg 10mEq

点滴静注 60分
生食 500ml
KCL 10mEq

Day2~5

持続点滴 24時間
生食 1000ml
5-FU 800mg/m²

・食事状況により生食を高カロリー輸液に変更する場合あり
・水分負荷は年齢・心腎機能により調整

備考	
----	--

薬品名	申請投与量	計算量	実際の投与量	薬価最小組み合わせ	
5-FU	800 mg/m ²	#REF! mg/body	mg/body	内 250mg 0mg 訳 1000mg 0mg	
シスプラチン	80 mg/m ²	#REF! mg/body	mg/body	内 10mg 0mg 訳 50mg 0mg	
併用内服薬	用量(1日量)	用法		投与期間	
アプレピタント	125mg	シスプラチン投与60分前までに内服		day1	
アプレピタント	80mg	分1 朝食後		day2、3	
デキサメタゾン	8mg	分2 朝昼食後		day2~5	