食道癌-009

がん化学療法個人計画書 患者の状態により輸液の内容・量及び 投与速度を変更する場合があります。 適応がん種 科名 食道癌 DTX+CDDP 投与予定 休薬を含めて 1クール 4~6 クール施行 day28 day1 day8 day15 day22 Day1 1クール28日 Day8 アプレピタント 125mg 内服 Day15 点滴静注 30分 点滴静注 30分 生食 100ml 生食 100ml ے8Day8 パロノセトロン 0.75mg デキサメタゾン 6.6mg dークロルフェニラミン 5mg デキサメタゾン 9.9mg 同内容 dークロルフェニラミン 5mg ★プライミング・フラッシュ 生食必要★ ★プライミング・フラッシュ 生食必要★ ・水分負荷は年齢、心腎機能により調整 点滴静注 60分 点滴静注 60分 生食 250ml 生食 250ml ドセタキセル 20mg/m ドセタキセル 20mg/m 点滴静注 60分 生食 500ml KCL 10mEq 硫酸Mg 10mEq 点滴静注 30分 15%マンニトール 250ml 備考 点滴静注 60分 生食 250ml シスプラチン 70mg/㎡ 点滴静注 60分 生食 500ml KCL 10mEq

薬品名	申請投与量	計算量	実際の投与量	薬価最小組み合わせ	備考
ドセタキセル	20 _{mg/m} ²	#REF! mg/body	mg/body	内 20mg 0mg 訳 80mg 0mg	
シスプラチン	70 mg∕ m [*]	#REF! mg/body	mg/body	内 10mg 0mg 訳 50mg 0mg	患者の状態に合わせて60~70mg/ ㎡で使用

併用内服薬	用量(1日量)	用法	投与期間
アプレビタント	125mg	シスプラチン投与60分前までに内服	day1
アプレピタント	80mg	分1 朝食後	day2、3
デキサメタゾン	8mg	分2 朝昼食後	day2∼4