

がん化学療法個人計画書

患者の状態により輸液の内容・量及び投与速度を変更する場合があります。

科名	適応がん種	レジメン名
	多発性骨髄腫	KRd
投与予定	休薬を含めて1クール 28 日 必要なクール数 継続	

Rp	薬品名	申請投与量	計算量	実際の投与量	手技・用法	投与時間	投与日(day→)						
							1	2	8	9	15	16	
1	生食 (ルートキープ)	50ml			点滴静注	5分	↓	↓	↓	↓	↓	↓	
2	★プライミングフラッシュ5%ブドウ糖液必要★												
	5%ブドウ糖液 +	100ml											
	1クール目のDay1・2のみ カルフィルゾミブ	20 mg/m ²	#REF! mg/body	mg/body									
	溶解用蒸留水	100ml規格で		実際の投与量 ml	点滴静注	10分	↓	↓	↓	↓	↓	↓	
	1クール目のDay8以降 カルフィルゾミブ	27 mg/m ²	#REF! mg/body	mg/body									
	溶解用蒸留水	100ml規格で		実際の投与量 ml									

13クール目以降はDay1・2・15・16のみ投与

Rp	薬品名	薬価最小組み合わせ	備考
2	カルフィルゾミブ	1クール目のDay1・2	10mg1vlは5ml 40mg1vlは20mlの注射用水で溶解し、必要量を5%ブドウ糖液に混合する。(配合変化を起こすので生食等では希釈しない)
		内訳	
		10mg 0mg	
		40mg 0mg	
		1クール目のDay8以降	
		内訳	
		10mg 0mg	
		40mg 0mg	

カルフィルゾミブは13クール目以降は、day1、2、15、16に施行

※カルフィルゾミブ投与日のデキサメタゾン
はカルフィルゾミブ投与の4時間～30分前に内服。

※※第1クールの日2、9、16はデキサメタゾン
4mgをカルフィルゾミブ投与の4時間～30分前
に内服。
第2クール以降はカルフィルゾミブによる発熱・
悪寒・息切れ等が認められた場合は継続す
る。

併用内服薬	用量(1日量)	用法	投与期間
レナリドミド	25mg	分1 朝食後	day1～21
デキサメタゾン (レナデックス)	40mg	分1 朝食後※	day1、8、15、22
(第1クール※※) デキサメタゾン (レナデックス)	4mg	分1 朝食後※※	day2、9、16

備考	
----	--