

がん化学療法個人計画書

患者の状態により輸液の内容・量及び投与速度を変更する場合があります。

科名	適応がん種	レジメン名
	多発性骨髄腫	Kd(週2回)
投与予定	休薬を含めて1クール 28 日 効果ある限り 継続	

Rp	薬品名	申請投与量	計算量	実際の投与量	手技・用法	投与時間	投与日(day -)						
							1	2	8	9	15	16	
1	生食 (ルートキープ)	50ml			点滴静注	5分	↓	↓	↓	↓	↓	↓	
★プライミングフラッシュ5%ブドウ糖液必要★													
2	5%ブドウ糖液 +	100ml			点滴静注	30分	↓	↓	↓	↓	↓	↓	
	1クール目のDay1・2のみ			#REF!									mg/body
	カルフィルゾミブ	20	mg/m ²	mg/body									実際の投与量 ml
	溶解用蒸留水	100ml規格で											
1クール目のDay8以降													
カルフィルゾミブ	56	mg/m ²	mg/body	実際の投与量 ml									
溶解用蒸留水	100ml規格で												

Rp	薬品名	薬価最小組み合わせ	備考	
2	カルフィルゾミブ	1クール目のDay1・2	10mg1vは5ml 40mg1vは20mlの注射用水で溶解し、必要量を5%ブドウ糖液に混合する。(配合変化を起こすので生食等では希釈しない)	
		内訳		10mg 0mg
		40mg 0mg		
		1クール目のDay8以降		
内訳	10mg 0mg			
40mg 0mg				

体表面積が2.2m²を超える患者では、体表面積2.2m²として投与量を算出すること。

※カルフィルゾミブ投与日のデキサメタゾン
はカルフィルゾミブ投与の4時間～30分前に内服。

デキサメタゾンの用量・投与期間は、患者の状態に変更する場合あり。

併用内服薬	用量(1日量)	用法	投与期間
デキサメタゾン (レナデックス)	20mg	分1朝食後※	day1、2、8、9、 15、16、22、23

備考	
----	--