

# がん化学療法個人計画書

患者の状態により輸液の内容・量及び投与速度を変更する場合があります。

科名	適応がん種	レジメン名
	多発性骨髄腫	VPd
投与予定	休薬を含めて 1クール 21 日	可能な限り 施行

	Rp	薬品名	申請投与量	計算量	実際の投与量	手技・用法	投与時間	投与日(day -)								
								1	4	8	11					
<input type="checkbox"/> 皮下注  <input type="checkbox"/> 静注	1	ボルテゾミブ 生食 (1vを生食1.2mlで溶解)	1.3 mg/m <sup>2</sup>	#REF! mg/body	mg/body 実際の投与量 ml	皮下注										
	2	ボルテゾミブ 生食 (1vを生食3mlで溶解)	1.3 mg/m <sup>2</sup>	#REF! mg/body	mg/body 実際の投与量 ml	静注	5分									
	3	生食	50ml			点滴静注	5分									

ボルテゾミブは9クール目以降は day1、8 のみ

Rp	薬品名	薬価最小组み合わせ	備考
1・2	ボルテゾミブ		皮下注射の場合、1vを生食1.2mlで溶解する。静注の場合、1vを生食3mlで溶解する。  皮下注:投与部位は左右の大腿部、腹部に交互に投与するなど注射部位を替えて行う

ボルテゾミブ・ポマリドミド・デキサメタゾンの用量・投与期間は、患者の状態に変更する場合があります。

デキサメタゾンは、76歳以上の患者では10mgへ減量を考慮する。

併用内服薬	用量(1日量)	用法	投与期間
ポマリドミド	4mg	分1朝食後	day1~14
デキサメタゾン (レナデックス)	20mg	分1朝食後	1~8クール: day1,2,4,5,8,9,11,12 9クール目以降: day1,2,8,9

備考	
----	--