


がん化学療法個人計画書

患者の状態により輸液の内容・量及び投与速度を変更する場合があります。

科名	適応がん種	レジメン名
	非小細胞肺癌	CBDCA+PEM+アテゾリズマブ
投与予定	休薬を含めて1クール21日 4又は6クール施行、以降アテゾリズマブ+PEM	



薬品名	申請投与量	計算量	実際の投与量	薬価最小組み合わせ	備考
アテゾリズマブ	1200 mg/body		mg/body		
ペムトレキセド	500 mg/m ²	#REF! mg/body	mg/body	内訳 100mg: 0mg 500mg: 0mg	
カルボプラチン	AUC=6	#REF! mg/body	mg/body	内訳 150mg: 0mg 450mg: 0mg	男性投与量
		#REF! mg/body	mg/body	内訳 150mg: 0mg 450mg: 0mg	女性投与量
併用内服薬	用量(1日量)	用法		投与期間	
ビタミンB12	1000 μg	筋注		初回投与の少なくとも7日前に投与。投与期間中及び投与中止後22日目まで9週ごと(3コースごと)に1回投与	
葉酸	0.5mg	1日1回内服		初回投与の7日以上前から連日投与 最終投与日から22日目まで可能な限り連日投与	
アプレビタント	125mg	カルボプラチン投与60分前までに内服		day1 (導入療法時)	
アプレビタント	80mg	分1 朝食後		day2, 3 (導入療法時)	
デキサメタゾン	8mg	分2 朝昼食後		day2~4 (導入療法時)	