


# がん化学療法個人計画書

患者の状態により輸液の内容・量及び投与速度を変更する場合があります。

科名	適応がん種	レジメン名
	非小細胞肺癌	CDDP+PEM
投与予定	休薬を含めて1クール 21 日	4~6 クール施行



1クール21日



・水分負荷は年齢・心腎機能により調整  
・減量に関する推奨事項あり

備考

薬品名	申請投与量	計算量	実際の投与量	薬価最小組み合わせ
ペムトレキセド	500 mg/m <sup>2</sup>	#REF! mg/body	mg/body	内 100mg 0mg 訳 500mg 0mg
シスプラチン	75 mg/m <sup>2</sup>	#REF! mg/body	mg/body	内 10mg 0mg 訳 50mg 0mg

併用内服薬	用量(1日量)	用法	投与期間
ビタミンB12	1000 μg	筋注	初回投与の少なくとも7日前に投与。投与期間中及び投与中止後22日目まで9週ごと(3コースごと)に1回投与
葉酸	0.5mg	1日1回内服	初回投与の7日以上前から連日投与 最終投与日から22日目まで可能な限り連日投与
アプレピタント	125mg	シスプラチン投与60分前までに内服	day1
アプレピタント	80mg	分1 朝食後	day2、3
デキサメタゾン	8mg	分2 朝昼食後	day2~4