



がん化学療法個人計画書

患者の状態により輸液の内容・量及び投与速度を変更する場合があります。

科名	適応がん種	レジメン名
	卵巣癌	DC
投与予定	休薬を含めて1クール 21 日 3~6クール施行	



・本レジメンにおける体表面積は藤本の式で計算。
 又、GFRに関してはCalvert式のGFRをJelliffeの式から計算。
 ・ドセタキセル75mg/m²で使用の場合カルボプラチンAUC=5で使用。

備考

薬品名	申請投与量	計算量	実際の投与量	薬価最小組み合わせ	備考
ドセタキセル	70 mg/m ²	#REF! mg/body	mg/body	内 20mg 0mg 訳 80mg 0mg	患者の状態に合わせて60~75mg/m ² で使用
カルボプラチン	AUC=5	#REF! mg/body	mg/body	内 150mg 0mg 訳 450mg 0mg	男性投与量 患者の状態に合わせてAUC=5~6で使用
		#REF! mg/body	mg/body	内 150mg 0mg 訳 450mg 0mg	女性投与量 患者の状態に合わせてAUC=5~6で使用

併用内服薬	用量(1日量)	用法	投与期間
アプレピタント	125mg	ドセタキセル 投与60分前までに内服	day1
アプレピタント	80mg	分1 朝食後	day2、3
デキサメタゾン	8mg	分2 朝昼食後	day2~4