


# がん化学療法個人計画書

患者の状態により輸液の内容・量及び投与速度を変更する場合があります。

科名	適応がん種	レジメン名
	卵巣癌	ドキソルビシン・リポソーム
投与予定	休薬を含めて1クール 28 日	6 クール施行



**Day1**

点滴静注 30分  
 生食 100ml  
 デキサメタゾン 6.6mg  
 ファモチジン 20mg

点滴静注 5分  
 5%ブドウ糖液 100ml

点滴静注 ☆120分  
 5%ブドウ糖液 250ml  
**ドキソルビシン・リポソーム**  
**40mg/m<sup>2</sup>**

点滴静注 30分  
 5%ブドウ糖液 100ml \*

**ドキソルビシン・リポソームの投与にあたってはインラインフィルターを使用しないこと**

\* 急速なフラッシュは避けること

**ドキソルビシン・リポソーム 注意点**

☆投与速度は1mg/分を超えない  
 (ドキソルビシン・リポソームは1mg=0.5mlであるのでブドウ糖との合計量を計算して投与)

- ・5%ブドウ糖液で希釈すること  
 (ドキソルビシン・リポソーム量が90mg以上の場合は500mlで希釈)
- ・[総投与量]500mg/m<sup>2</sup>を超えないこと
- ・休薬、減量、中止にする場合は用量調節基準あり

備考

薬品名	申請投与量	計算量	実際の投与量	薬価最小組み合わせ	備考
ドキソルビシン・リポソーム	40 mg/m <sup>2</sup>	#REF! mg/body	mg/body		患者の状態に合わせて40~50mg/m <sup>2</sup> で使用可

併用内服薬	用量(1日量)	用法	投与期間