がん化学療法個人計画書 患者の状態により輸液の内容・量及び 投与速度を変更する場合があります。





Day8

アプレピタント125mg 内服

点滴静注 60分 生食 500ml

点滴静注 30分 生食 100ml パロノセトロン 0.75mg デキサメタゾン 9.9mg

> 点滴静注 5分 生食 50ml フロセミド 20mg

★プライミング・フラッシュ 生食必要★

点滴静注 120分 生食 500ml シスプラチン 60mg/㎡

点滴静注 60分 生食 500ml 〇水分負荷は年齢・心腎機能により調整

S-1						
1.25㎡未満	80mg/body/日					
1.25~1.5㎡未満	100mg/body/日	1日2回朝夕食後	3週間投与 2週間休薬			
1.5㎡以上	120mg/body/日					

備考

薬品名	申請投与量	計算量	実際の投与量	薬価最小組み合わせ	備考
シスプラチン	60 mg/m ²	#REF! mg/body	mg/body	内 10mg 0mg 訳 50mg 0mg	
S-1		登録時の 量は上記表参照	mg/body		記載投与量は1日の投与量

併用内服薬	用量(1日量)	用法	投与期間
アプレビタント	125mg	シスプラチン投与60分前までに内服	day8
アプレピタント	80mg	分1 朝食後	day9、10
デキサメタゾン	8mg	分2 朝昼食後	day9 ~ 11