


がん化学療法個人計画書

患者の状態により輸液の内容・量及び投与速度を変更する場合があります。

科名	適応がん種	レジメン名
	胃癌	イリノテカン B
投与予定	2週間隔で2~3回投与、3週間以上休薬 1クール 35又は49日 施行可能な限り	



Day1

点滴静注 30分
 グラニセトロンバック3mg 100ml
 デキサメタゾン 9.9mg

点滴静注 90分
 生食 500ml
イリノテカン
150mg/m²

点滴静注 5分
 生食 50ml

Day15

Day1と
同内容

Day29

Day1と
同内容

備考

薬品名	申請投与量	計算量	実際の投与量	薬価最小組み合わせ
イリノテカン	150 mg/m ²	#REF! mg/body	mg/body	内 40mg 0mg 訳 100mg 0mg

併用内服薬	用量(1日量)	用法	投与期間
炭酸水素ナトリウム	1.5g	分3 毎食間	day1~4、15~18、 (29~32)
酸化マグネシウム	2.0g	分3 毎食後	
ウルソデオキシコール酸	300mg		
メクロプラミド	15mg	分2 朝昼食後	day2、3、16、17、(30、31)
デキサメタゾン	8mg		

・デキサメタゾンを除く併用内服薬は患者の状態に合わせて使用
 ・患者の状態により内服の5-HT3受容体拮抗剤を処方する場合あり。