


# がん化学療法個人計画書

患者の状態により輸液の内容・量及び投与速度を変更する場合があります。

科名	適応がん種	プロトコール名
	尿路上皮癌	M-VAC(ピラルビシン)
投与予定	休薬を含めて1クール 28 日 1~6 クール施行	



薬品名	申請投与量	計算量	実際の投与量	薬価最小組み合わせ	備考
メトレキサート	30 mg/m <sup>2</sup>	#REF! mg/body	mg/body		*day15、22中止になることが多い→連絡不要
シスプラチン	70 mg/m <sup>2</sup>	#REF! mg/body	mg/body	内 10mg: 0mg 誤 50mg: 0mg	
ビンブラスチン	3 mg/m <sup>2</sup>	#REF! mg/body	mg/body		*day15、22中止になることが多い→連絡不要
ピラルビシン	30 mg/m <sup>2</sup>	#REF! mg/body	mg/body		【総投与量】950mg/m <sup>2</sup> を超えないこと

併用内服薬	用量(1日量)	用法	投与期間
アロプリノール含嗽液	500ml	1日3~5回	1週間
アプレピタント	125mg	シスプラチン投与60分前までに内服	day2
アプレピタント	80mg	分1 朝食後	day3、day4
デキサメタゾン	8mg	分2 朝昼食後	day3~day5